

Surveillance de la maladie de Lyme au Canada

Faits saillants 2009–2019

Données du Système canadien de surveillance des maladies à déclaration obligatoire et du Système de surveillance renforcé de la maladie de Lyme de l'Agence de la santé publique du Canada

Qu'est-ce que LA MALADIE DE LYME?

LA MALADIE DE LYME est la zoonose transmise par les tiques la plus signalée au Canada. Elle est causée par la bactérie *Borrelia burgdorferi* et transmise par les tiques occidentales à pattes noires (*Ixodes pacificus*) en Colombie-Britannique et par les tiques à pattes noires (*Ixodes scapularis*) dans le centre et l'est du Canada.

La maladie de Lyme est **une infection multisystémique** qui peut affecter **la peau, le cœur, les articulations et le système nerveux**. La plupart des gens mordus par une tique infectée par *Borrelia burgdorferi* développeront une éruption cutanée (érythème migrant), qui peut être accompagnée de symptômes grippaux. **En l'absence de traitement**, la bactérie peut se propager dans le sang et provoquer de multiples lésions cutanées secondaires, des symptômes cardiaques (cardiopathie, bloc atrio-ventriculaire, arythmie et palpitations) et des symptômes neurologiques (paralysie faciale—paralysie de Bell—et méningite). **Des mois à des années après l'infection**, la maladie de Lyme tardive disséminée peut se manifester par des épisodes d'arthrite uniques ou récurrents.


QUELLES sont les TENDANCES?

10 150

cas de la maladie de Lyme rapportés (2009–2019)


71 %
cas confirmés

29 %
cas probables



Sur les **363** cas humains acquis à l'extérieur du Canada :

57 % exposés aux É.-U.
41 % exposés en Europe



SAISONNALITÉ

Plus grand nombre de cas acquis durant les mois d'été

juin **20 %** des cas
juillet **35 %** des cas
août **19 %** des cas




janv. févr. mars avril mai **juin juil.** août sept. oct. nov. déc.

CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES

GROUPES D'ÂGE À RISQUE ÉLEVÉ :

- Les incidences (cas pour 100 000 habitants) étaient **plus élevées** chez les **enfants âgés de 5 à 9 ans** (45,0) et chez les **adultes âgés de 65 à 69 ans** (74,3)
- 57 %** de tous les cas signalés sont survenus chez des adultes âgés de **50 à 84 ans**



Quels sont LES SYMPTÔMES rapportés DE LA MALADIE DE LYME pour les cas acquis localement ?

Stade **localisé précoce**



75 %

érythème migrant unique

Stade **disséminé précoce**



4 %

cardiopathie, bloc atrio-ventriculaire, arythmie et palpitations



8 %

paralysie de Bell (paralysie faciale)



19 %

autres symptômes neurologiques

Stade **disséminé tardif**



34 %

épisodes d'arthrite uniques ou récurrents

LIENS CONNEXES :

1. Surveillance de la maladie de Lyme au Canada, 2009 à 2019
2. Visitez Canada.ca pour la définition de cas de la maladie de Lyme
3. Visitez Canada.ca pour obtenir des renseignements sur les zones à risque

4. Pages Web sur la maladie de Lyme à Canada.ca

5. <https://www.etick.ca/>

MÉDIAS SOCIAUX :

[Canadiens en santé](https://www.facebook.com/CanadiensEnSanté)
 [@GouvCanSanté](https://twitter.com/GouvCanSanté)