



الوقاية من الزُّهري والاعتناء به: نصائح للمؤسسات المجتمعية

إجراءات يمكنك القيام بها كمقدم خدمة لدعم العملاء بالوقاية من الزُّهري والاعتناء به

بصفتك مقدم خدمة، فأنت شريك أساسي في جهود كندا لخفض المعدلات المتزايدة للإصابة بالزُّهري. ويمكنك من خلال العلاقات القائمة مع الفئات السكانية الأساسية في مجتمعاتك الاستمرار في المساعدة على جعل المحادثات حول الصحة الجنسية أمراً عادياً وإزالة الحرج عنها، كما قد تكون أنت نقطة التواصل الأولى للعملاء الذين قد يشعرون بعدم الراحة لدخولهم إلى نظام الرعاية الصحية.

نصائح لمناقشة الوقاية من الزُّهري والاعتناء به مع العملاء

اكتشف



تعرف على الوقاية من الزُّهري، وفحصه وعلاجه

- راجع المصادر الموثوقة، مثل المصادر المنشورة من الحكومات أو وسطاء المعرفة بالصحة الجنسية، وذلك ليزداد ارتياحك عند مناقشة الوقاية من الزُّهري والاعتناء به
- تفضل بزيارة الروابط التالية للاطلاع على مصادر إضافية لدعم معرفتك:

○ الزُّهري، وكالة الصحة العامة في كندا (PHAC): <https://www.canada.ca/syphilis>

○ المصادر حول الزُّهري، CATIE: <https://www.catie.ca/syphilis-resources>

تواصل



شارك المعلومات الأساسية واستعد للإجابة على الأسئلة حول الزُّهري

- إذا تُرك الزُّهري بدون علاج، فقد يتسبب في مشاكل صحية خطيرة، حيث يؤثر على عدة أعضاء وأجهزة بما في ذلك المخ، والعينين، والقلب، والأعصاب والعظام
- يمكن أن يؤدي الزُّهري في الحمل في حالة عدم علاجه إلى إجهاض أو ولادة جنين ميت، أو يؤدي إلى الزُّهري الخلقي
- بينما لا يعتبر العديد من الأشخاص أنفسهم عُرضة لخطر الإصابة به، أي شخص نشط جنسياً قد يُصاب بالزُّهري
- تزداد حالات الإصابة بالزُّهري في كندا؛ ففي عام 2022، كانت هناك 13,953 حالة مسجلة للإصابة بالزُّهري المُعدي و117 حالة مؤكدة من الزُّهري الخلقي المبكر

أهمية

Canada



انتقال

- الزُّهري هو عدوى منقولة جنسياً تنتقل بالتلامس المباشر مع آفة معدية أثناء الجنس التناسلي، أو الشرجي أو الفموي
- قد ينتقل الزُّهري أيضاً إلى الأطفال أثناء الحمل من خلال المشيمة، أو عند الولادة من خلال التلامس المباشر مع آفة معدية
- يكون الزُّهري في أوج قوته وقدرته على العدوى في المراحل المبكرة في الوقت الذي يكون فيه الأشخاص ربما لم يلاحظوا أي أعراض

لفحص

- عادةً ما يُفحص الزُّهري بعينات الدم؛ كما يمكن سحب المسحات من أي قرح أو طفح جلدي
- يُوصى بفحص الزُّهري لجميع الأشخاص النشطين جنسياً ولهم شريك جديد/شريكة جديدة أو عدة شركاء، و/أو عند طلب الشخص
- يُوصى بإجراء فحص الزُّهري كل 3 إلى 6 أشهر للأفراد الذين لهم عدة شركاء جنسيين
- يُوصى بالفحص الشامل للسيدات الحوامل خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل أو عند أول زيارة أثناء الحمل، ويُوصى بتكرار الفحص في الثلاثة أشهر الأخيرة وأثناء الولادة للأشخاص المعرضين لخطر أكبر

العلاج

- يمكن علاج الزُّهري والشفاء منه باستخدام المضادات الحيوية، وعادةً ما تُعطى بالحقن، ويمكنها المساعدة في منع انتقاله إلى الشركاء الجنسيين
- يُعد علاج الزُّهري في الحمل آمناً ويمكنه منع انتقال الزُّهري إلى الأطفال في طور النمو

المتابعة

- يُعد الفحص بالمتابعة المنتظمة بعد العلاج مهماً لتأكيد شفاء الزُّهري، كما أنه فرصة لتلقي معلومات أساسية حول الصحة الجنسية والإنجابية من أجل مستقبل صحي

الإبلاغ

- تُبلغ نتائج الاختبار الإيجابية إلى وحدات الصحة العامة المحلية للمساعدة في مراقبة صحة المجتمع بأكمله
- لن يعرف عن إصابة العميل بالعدوى سوى العميل، ومقدم الرعاية الصحية الخاص به وممرضة الصحة العامة
- قد تعرض ممرضة الصحة العامة مساعدة العميل في إبلاغ الشركاء الحاليين والسابقين أنهم بحاجة للخضوع للفحص

الدعم



ساعد العملاء في البحث عن خدمات الصحة الجنسية ووسائل الدعم الاجتماعي الأخرى

- تفضل بزيارة الروابط التالية للاطلاع على موارد إضافية يمكنها مساعدتك في دعم العملاء الذين يبحثون عن خدمات الصحة الجنسية ووسائل الدعم الاجتماعي الأخرى:

○ مكتشف الخدمات، CATIE، <https://whereto.catie.ca>

○ الخدمات ووسائل الدعم بالقرب منك، NWAC:

<https://stbbi.nwac.ca/services-and-supports-near-you>

للمزيد من التفاصيل، اطلع على إرشادات STBBI (العدوى المنقولة جنسياً والمحمولة بالدم) للمتخصصين الصحيين: دليل الزُّهري: الفرز والاختبار التشخيصي - Canada.ca.
التوصيات لا تحل محل أي متطلبات قطرية/إقليمية تشرعية، وتنظيمية، وسياسية وخاصة بالممارسات أو الإرشادات الاحترافية التي تحكم ممارسة المتخصصين الصحيين في اختصاصاتهم الخاصة بهم، والذين قد تختلف توصياتهم بسبب الوبائيات المحلية أو السياق.

© صاحب الجلالة الملك في حق كندا، ويمثله وزير الصحة، 2024 عام: 1 230893 | (Print) 978-0-660-70886-7 / (PDF) 978-0-660-70885-0
Cat: H14-581/2024Ara-PDF // H14-581/2024Ara (Print)

Canada

