

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA SÍFILIS:

consejos para organizaciones comunitarias.



Acciones que usted puede tomar como proveedor de servicios para apoyar a clientes en la prevención y tratamiento de la sífilis

Como proveedor de servicios, usted es un socio esencial en los esfuerzos de Canadá para frenar las tasas crecientes de sífilis. A través de las relaciones claves establecidas en sus comunidades, usted puede continuar ayudando a normalizar y a desestigmatizar las conversaciones acerca de la salud sexual, y ser el primer punto de contacto para clientes que se pueden sentir incómodos accediendo al sistema de cuidado de la salud.

Consejos para hablar sobre prevención y tratamiento de la sífilis con los clientes



Aprenda

Aprenda sobre la prevención, pruebas y tratamiento de la sífilis

- Consulte fuentes confiables, como publicaciones gubernamentales o de expertos en conocimiento sobre la salud sexual, para sentirse más cómodo hablando sobre la prevención y tratamiento de la sífilis
- Visite los siguientes enlaces para encontrar recursos adicionales que apoyen su aprendizaje:
 - Sífilis, Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC): <https://www.canada.ca/syphilis>
 - Recursos sobre la sífilis, CATIE: <https://www.catie.ca/syphilis-resources>



Comunicación

Comparta información clave y prepárese para contestar preguntas acerca de la sífilis

Importancia

- Si no es tratada, la sífilis puede causar serios problemas de salud, afectar múltiples órganos y sistemas incluyendo el cerebro, ojos, corazón, nervios, y huesos
- La sífilis no tratada durante el embarazo puede resultar en un aborto espontáneo o el nacimiento de un niño muerto, o llevar a una sífilis congénita
- Aunque muchas personas consideran no estar bajo riesgo alguno, cualquier persona que esté activa sexualmente puede contraer la sífilis
- Los casos de sífilis están aumentando en Canadá; en el año 2022 se reportaron 13,953 casos de infecciones de sífilis y 117 casos confirmados de sífilis congénita prematura



Transmisión

- La sífilis es una infección transmitida sexualmente a través de contacto directo con una lesión infecciosa durante actividad sexual genital, anal u oral
- La sífilis también se puede transmitir a los bebés durante el embarazo a través de la placenta, o al nacer a través de contacto directo con la lesión infecciosa
- La sífilis es más contagiosa en las primeras etapas cuando las personas todavía no han notado ningún síntoma

Pruebas¹

- Usualmente se hacen pruebas para detectar la sífilis con muestras de sangre; también se pueden tomar muestras de cualquier lesión o erupción
- Las pruebas para detectar la sífilis se recomiendan a todas las personas que son activas sexualmente con una pareja nueva o con múltiples parejas, y/o a petición del individuo
- Las pruebas para detectar la sífilis se recomiendan cada 3 a 6 meses para individuos con múltiples parejas sexuales
- Las pruebas universales se recomiendan para mujeres embarazadas durante el primer trimestre o en la primera visita prenatal, y se recomienda repetir las pruebas en el tercer trimestre y durante el parto a mujeres de alto riesgo

Tratamiento

- La sífilis puede ser tratada y curada con antibióticos, generalmente administrados por medio de una inyección, los cuales pueden ayudar a prevenir la transmisión a las parejas sexuales
- El tratamiento de sífilis en el embarazo es seguro y puede prevenir que la sífilis se transmita a bebés en desarrollo

Seguimiento

- El seguimiento regular con pruebas después del tratamiento es importante para confirmar que la sífilis ha sido curada, y es una oportunidad para recibir información clave sobre la salud sexual y reproductiva para un futuro saludable

Notificación

- Los resultados positivos de las pruebas son reportados a las unidades de salud pública local para ayudar a monitorear la salud de toda la comunidad
- Solamente el cliente, su proveedor de cuidado de la salud y la enfermera de salud pública sabrán que el cliente tiene una infección
- Una enfermera de salud pública tal vez pueda ofrecer ayuda al cliente para notificar a sus parejas actuales o pasadas que necesitan hacerse la prueba



Apoyo

Ayude a los clientes a navegar los servicios de salud sexual y otros apoyos sociales

- Visite los siguientes enlaces para recursos adicionales que le pueden ayudar a dar apoyo a los clientes usando los servicios de salud sexual y otros apoyos sociales:
 - Buscador de servicios, CATIE: <https://whereto.catie.ca/>
 - Servicios y apoyo cerca de usted, NWAC: <https://stbbi.nwac.ca/services-and-supports-near-you/>

¹Para más detalles, vea las guías de STBBI para Profesionales de la Salud: [Syphilis guide: Screening and diagnostic testing on Canada.ca](https://www.stbbi.ca/Syphilis-guide-Screening-and-diagnostic-testing-on-Canada.ca). Las recomendaciones no reemplazan ningún requisito legislativo, reglamentario, normativo y práctico provincial/territorial, ni directrices profesionales que rijan la práctica de los profesionales de la salud en sus respectivas jurisdicciones, cuyas recomendaciones pueden diferir debido a la epidemiología o el contexto local.

©Su Majestad el Rey por Derecho de Canadá, representado por el Ministro de Salud, 2024 Pub: 230892 | Cat: H14-581/2024Spa-PDF // H14-581/2024Spa (Print) | ISBN: 978-0-660-70883-6 (PDF) / 978-0-660-70884-3 (Print)



Canada 